

## เอกสารข้อเท็จจริง

## ผู้หญิงกับซิฟิลิส



ซิฟิลิสคือโรคติดเชื้อร้ายแรงและมีผู้หญิงในออสเตรเลียติดเชื้อนี้มากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซิฟิลิสและวิธีการว่าคุณจะป้องกันตนเองได้อย่างไร

ซิฟิลิส คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ร้ายแรง ที่ถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งระหว่างการมีเพศสัมพันธ์



### ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 44 ปีติดเชื้อนี้มากขึ้น

ระหว่างปี 2016 ถึงปี 2022 อัตราการติดเชื้อซิฟิลิสของผู้หญิงอายุ 15 ถึง 44 ปีในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 158



### คุณอาจไม่รู้ว่าคุณมีเชื้อซิฟิลิสอยู่

บางคนอาจไม่รู้สึกรู้หายหรือไม่รู้ว่าคุณเองมีเชื้อซิฟิลิสอยู่ เป็นไปได้ว่าคุณจะมีเชื้ออยู่และแพร่เชื้อสู่คู่นอนของคุณโดยไม่รู้ตัว

เราขอแนะนำให้คุณและคู่นอนของคุณตรวจหาเชื้อเอสทีไอ (STI) แบบเต็มรูปแบบเป็นประจำ แม้ว่า คุณจะไม่มีอาการใด ๆ ก็ตาม

หากพบว่าคุณมีเชื้อซิฟิลิสอยู่ บอกกับคู่นอนของคุณ เพื่อที่เขาจะได้ตรวจหาเชื้อและรับการรักษาด้วย วิธีนี้จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อกลับไปสู่คุณและผู้อื่น



### อาการของซิฟิลิสแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากคุณติดเชื้อซิฟิลิส สัญญาณแรก ๆ คือ แผลที่มีอาการเจ็บหรือแผลเปื่อยที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ทวารหนัก และปาก

เมื่อเวลาผ่านไปอาการอื่น ๆ จะปรากฏออกมา

- ผื่น
- รอยโรคบนผิวหนัง
- ต่อม้ำเหลืองบวม
- ผมรั่ว
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ
- ปวดศีรษะ
- อ่อนเพลีย



### หากไม่ทำการรักษาซิฟิลิสอาจเป็นสาเหตุให้เกิด

- การติดเชื้อในสมอง
- ภาวะสมองเสื่อม
- ปอดและหัวใจล้มเหลว
- ตาบอด
- การเสียชีวิต

\*Australian Department of Health and Aged Care, (2023), National Notifiable Disease Surveillance System. Available at <https://nindss.health.gov.au/pbi-dashboard>

# เอกสารข้อเท็จจริง ผู้หญิงกับซิฟิลิส

## การถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิสสู่ลูกของคุณทำให้เกิดการเสียชีวิตได้

หากคุณมีเชื้อซิฟิลิสและกำลังตั้งครรภ์ คุณอาจถ่ายทอดเชื้อสู่ลูกของคุณก่อนที่จะคลอด

นี่คือสิ่งที่รู้จักกันว่าโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดและอาจเป็นสาเหตุให้เกิด

- ภาวะแท้ง
- ทารกตายคลอด
- การคลอดก่อนกำหนด
- น้ำหนักแรกเกิดน้อย
- การตายของทารกแรกเกิด

โรคซิฟิลิสแต่กำเนิดอาจทำให้สมองหรืออวัยวะของลูกของคุณเสียหายถาวร ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

เด็กบางคนอาจไม่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการจนกระทั่งเมื่อเขาโตขึ้น นำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่ล่าช้า

## การตรวจหาเชื้อเป็นประจำช่วยคุณได้

เราขอแนะนำให้คุณตรวจหาเชื้อเอสทีไอ (STI) แบบเต็มรูปแบบเป็นประจำแม้ว่าคุณจะไม่มีอาการใด ๆ ก็ตามและโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์

การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสเป็นการตรวจตามกำหนดที่สำคัญระหว่างตั้งครรภ์

คุณจะต้องตรวจหาเชื้ออย่างน้อยสองครั้งระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด เนื่องจากการแพร่เชื้อซิฟิลิสในชุมชนมากขึ้น อาจมีการตรวจหาเชื้อซิฟิลิสเพิ่มเติมหากมีโอกาสสูงว่าคุณจะติดเชื้อ

## การรักษาที่ง่าย

การรักษาซิฟิลิสที่ง่าย ยา (ปกติเป็นการฉีด) ฆ่าเชื้อได้และเป็นยาที่ปลอดภัยสำหรับคุณและลูกคุณต้องตรวจเลือดหลังการรักษาเพื่อตรวจสอบว่าการรักษานั้นได้ผลหรือไม่

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศของคุณสามารถรักษาและติดตามอาการของคุณได้

## จะป้องกันซิฟิลิสได้อย่างไร

วิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันซิฟิลิสคือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

- ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนใหม่และใช้สารหล่อลื่นที่ปลอดภัยต่อถุงยางอนามัย (เช่น ชนิดน้ำหรือซิลิโคน)
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศกับคนที่มึนเมาที่มีอาการเจ็บหรือแผลเปื่อยที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ทวารหนัก และปาก
- ตรวจหาเชื้อเอสทีไอ (STI) รวมถึงซิฟิลิสเป็นประจำ
- คู่นอนควรตรวจหาเชื้อเป็นประจำ (และรับการรักษา) เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อซิฟิลิสกลับไปสู่คุณและผู้อื่น
- หาก你不สะดวกที่จะบอกกับคู่นอนของคุณเอง ไปที่ [www.letthemknow.org.au](http://www.letthemknow.org.au) เพื่อขอคำแนะนำหรือพูดคุยกับแพทย์ทั่วไป (GP) หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ



สแกน QR Code เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิฟิลิสและสุขภาพของผู้หญิง