

更多信息

乙肝治疗

若您患有慢性乙肝，则需每 6 – 12 个月定期到医生处检查肝脏的健康状况，因为肝损伤随时都有可能发生。

药物可以控制乙肝病毒，减少对肝脏的损伤，并降低肝癌风险。医生会向您说明您是否需要服药。

接种乙肝疫苗

接种疫苗是预防乙肝的最佳方式。接种乙肝疫苗后，您将不会被乙肝病毒感染。

在澳大利亚，新生儿、儿童、青少年、及乙肝患者的家人和密切接触者都可以免费接种乙肝疫苗。

请向您的家庭医生咨询乙肝疫苗的具体事宜。

您还可以通过以下途径了解更多信息

新州多元文化艾滋病毒与肝炎服务中心
(Multicultural HIV and Hepatitis Service)
中文信息

 www.mhahs.org.au

 info@mhahs.org.au

 TheMHAHS

新州肝炎协会
(Hepatitis NSW)
肝炎资讯热线

 www.hepb.org.au

 1800 803 990

澳大利亚肝炎防治协会
(Hepatitis Australia)
全国热线

 www.hepatitisaustralia.com

 1300 437 222

翻译服务 (TIS)
请中文口译员帮忙


 131 450

mhahs.org.au/zh-hans/hepatitis-b/testing-for-hepatitis-b/

2019

乙肝

您是否有乙肝？
想知道。检测一下。



乙肝是什么？

乙型肝炎，简称乙肝，是一种乙型肝炎病毒所引发的肝脏感染。

“肝炎”即指肝脏发炎。当肝脏发炎或受损时，它可能无法正常工作，这会影响到您的健康。

肝炎分急性（短期）和慢性（长期）两种。

急性乙型肝炎是指感染乙型肝炎病毒的人能在6个月内排除病毒。一旦排除病毒，他们就无法再次受到乙型肝炎病毒感染，也无法传染给其他人。

慢性乙肝是指持续发炎时间超过6个月的乙肝。慢性乙肝有可能导致肝损伤（肝硬化）和肝癌。

大多数慢性乙肝患者并不知情，因为乙肝症状有可能需要几年时间才会显现出来。

健康肝脏

受损肝脏




您是否患有慢性乙肝？

乙肝在我们的社区很常见。

澳大利亚大多数慢性乙肝患者均出生于乙肝多发国家。

全球乙肝分布情况



一个人感染乙肝病毒时年龄越小，成年后患慢性乙肝的风险就越高。最常见的传播途径包括：

- 出生时的母婴传播。
- 幼年时通过皮肤溃烂处和伤口的人际传播。

90%感染乙肝病毒的婴儿，将来会患有慢性乙肝。

化验一下

了解自己是否有慢性乙肝的唯一途径是进行乙肝血检。过程简单快捷。

如果您符合以下任何一种情况，请让您的医生为您做乙肝检测：

- 出生于乙肝高发国家/地区，或曾在这些国家/地区生活。
- 您的家庭成员中有乙肝病毒携带者、或有人患有肝脏疾病或肝癌。
- 您与慢性乙肝患者住在一起。
- 您曾有过无保护措施性行为（没有避孕套的性行为）。
- 曾在澳大利亚以外的国家/地区接受过医疗手术或牙科手术，而这些国家/地区的设备未经适当消毒（清洁）。
- 曾接受过涉及血液的操作，如纹身、穿孔或针灸。
- 曾在境外接受输血，或于1990年之前在澳大利亚接受输血。

